

Щедрий врожай з кожного гектара!

каталог 2025



Розділи

ГУМІНОВІ ДОБРИВА

- 04 Гумат калію УНІВЕРСАЛЬНИЙ
- 05 Гумат калію NAWÓZ
- 06 Гумат калію +БОР
- 07 Гумат калію +ЦИНК
- 08 Деструктор стерні

МІКРОДОБРИВА

- 10 Мікродобриво БОР
- 11 Хелат ЦИНК

ПРИЛИПАЧ-АД'ЮВАНТ

- 13 Прилипач



Гумінові добри́ва

Гумат Калію Універсальний



Фасування:

- 30 мл
- 0,5 л
- 1 л
- 5 л
- 20 л
- 1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,4 – 0,7 л/га.

Хімічний склад:

Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)
12 г/л.	0,7 г/л.	13,8 г/л.

- містить макро- та мікроелементи
B, Co, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo
- гумусові речовини – 104 г/л.

- гумінові кислоти – 70 г/л.
- фульвокислоти – 34 г/л.
- pH – 10-11



Гумат калію (торф'яний) — концентроване орґано-мінеральне гумінове добриво, яке містить макро- та мікроелементи. Препарат позитивно сприяє на швидкий ріст, якісний розвиток кореневої системи, запобігає захво-

руванням, підвищує врожайність сільсько-господарських і садових культур, декоративних рослин. Гумат калію сприяє захисту рослини від захворювань і допомагає швидко адаптуватися під зміни несприятливих погодних умов.

Переваги добрива:

- ✓ скорочує терміни дозрівання с/г культур;
- ✓ покращує стійкість рослин до стресових умов (засухи, морозів, геріцидів тощо);
- ✓ стимулює міцну кореневу систему та ріст рослини;
- ✓ збільшує стійкість росту зелених насаджень, через високий вміст калію;
- ✓ прискорює засвоєння макро- мікроелементів;
- ✓ знижує к-сть використання мінеральних добрив;
- ✓ покращує ріст вмісту цукру, вітамінів, хлорофілу, олії, клейковини;
- ✓ збільшує врожайність.

Застосування для позакореневого підживлення:

Культура	Обробка насіння	Обробка в період вегетації
Пшениця озима і яра, ячмінь, овес, соняшник, кукурудза на зерно, солос, соя	Протруювання насіння спільно з будь-якими протруйниками перед посівом. Розвести 0,36 л гумату на 10 л води (робочий розчин) на 1 тону насіння.	2-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е – обприскування у фазу кущення - початку виходу в трубку; 2-е – обприскування у фазу цвітіння - початок молочної стиглості. 0,4 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Овочі	Замочування насіння в розчині добрива перед посадкою. Час замочування 15 годин. Витрата робочого розчину 1 л на 1 кг насіння. Приготування робочого розчину - 10 грам добрива розвести в 10-ти літрах води.	3-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е – обприскування у фазу появи 2-4-х справжніх листків; 2-е і 3-е обприскування з інтервалом 15 днів. 0,4 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Картопля	Обробка бульб перед посадкою. Витрата робочого розчину 40 л на тону насіння. Приготування робочого розчину- 10 грам добрива розвести в 10-ти літрах води.	2-х кратне обприскування посівів: 1-е – обприскування у фазу появи 5-7 листків; 2-е – обприскування у фазу бутонізації. 0,4 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Плодові дерева	Замочування коренів саджанців в розчині добрива перед посадкою. Час замочування 24 години. Витрата добрива 130 грам на 100 л води.	4-х кратне обприскування дерев в період вегетації: 1-е – обприскування через 5-7 днів після цвітіння; 2-е – обприскування на початку фізіологічного опадання зав'язей; 3-е – обприскування в період закладки квіткових бруньок; 4-е – обприскування в період інтенсивного зростання плодів. 1,3 л розвести на 1000 л води та розчином обробити 1 га.

Рекомендація

Для кращого ефекту можна використовувати в комплексі з карбамідом.

Пшениця, соняшник, кукурудза, ріпак тощо

6-10 кг карбаміду на 1 гектар

Бобові

4-6 кг карбаміду на 1 гектар



ГАЛИЧИНА

ОРґАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Гумат Калію NAWÓZ



Фасування:

- 0,5 л
- 1 л
- 5 л
- 20 л
- 1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,5 – 1 л/га.

Хімічний склад:

Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)
15,5 г/л.	5 г/л.	20 г/л.

- містить макро- та мікроелементи
B, Co, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo
- гумусові речовини – 100 г/л.

- гумінові кислоти – 87 г/л.
- фульвокислоти – 13 г/л.
- pH – 8-8,5



Гумат калію NAWÓZ – комплексне концентроване орґано-мінеральне гумінове добриво, розроблене за європейськими стандартами та сертифіковане в ЄС (EXPORT). Збагачене

калієм, азотом та фосфором, що сприяє активізації росту рослин, посиленню їх стійкості до хвороб, несприятливих умов. Препарат скорочує термін дозрівання с/г культур та збільшує їх врожайність.

Переваги добрива:

- забезпечує інтенсивний ріст рослини, завдяки вмісту азоту;
- забезпечує формування квітів та насіння рослин, через вміст фосфору;
- скорочує терміни дозрівання с/г культур;
- збільшує стійкість росту зелених насаджень;
- підвищує схожість насіння;
- покращує стійкість рослин до стресових умов та використання гербіцидів;
- формує та стимулює міцну кореневу систему;
- збільшує врожайність.

Застосування для позакореневого підживлення:

Культура	Обробка насіння	Обробка в період вегетації
Пшениця озима і яра, ячмінь, овес соняшник, кукурудза на зерно, силос	Протруювання насіння спільно з будь-якими протруйниками перед посівом. Розвести 0,4 л гумату на 10 л води (робочий розчин) на 1 тону насіння	2-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е – обприскування у фазу кущення - початку виходу в трубку; 2-е – обприскування у фазу цвітіння - початок молочної стиглості. 0,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Овочі	Замочування насіння в розчині добрива перед посадкою. Час замочування 15 годин. Витрата робочого розчину 1 л на 1 кг насіння. Приготування робочого розчину - 20 грам добрива розвести в 10-ти літрах води.	3-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е – обприскування у фазу появи 2-4-х справжніх листків; 2-е і 3-е обприскування з інтервалом 15 днів. 0,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Картопля	Обробка бульб перед посадкою. Витрата робочого розчину 40 л на тону насіння. Приготування робочого розчину - 20 грам добрива розвести в 10-ти літрах води.	2-х кратне обприскування посівів: 1-е – обприскування у фазу появи 5-7 листків; 2-е – обприскування у фазу бутонізації. 0,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га.
Плодові дерева	Замочування коренів саджанців в розчині добрива перед посадкою. Час замочування 24 години. Витрата добрива 150 грам на 100 л води.	4-х кратне обприскування дерев в період вегетації: 1-е – обприскування через 5-7 днів після цвітіння; 2-е – обприскування на початку фізіологічного опадання зав'язей; 3-е – обприскування в період закладки квіткових бруньок; 4-е – обприскування в період інтенсивного зростання плодів. 1,5 л розвести на 1000 л води та розчином обробити 1 га.

Рекомендація

Для кращого ефекту
можна використовувати
в комплексі з карбамідом.

Пшениця, соняшник,
кукурудза, ріпак тощо

6-10 кг карбаміду
на 1 гектар

Бобові

4-6 кг карбаміду
на 1 гектар



ГАЛИЧИНА

ОРґАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Гумат Калію +БОР



Фасування:

5 л

20 л

1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,75 – 1,5 л/га.

Хімічний склад:

Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)	Бор (B)
22,7 г/л.	0,9 г/л.	13,3 г/л.	29,5 г/л.

- містить макро- та мікроелементи
Co, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo
- гумусові речовини – 99,1 г/л.

- гумінові кислоти – 77,1 г/л.
- фульвокислоти – 22 г/л.
- pH – 8-9



Гумат калію + БОР – орґано-мінеральне добриво, що сприятливо впливає на розвиток рослин. Вміст бору у складі препарату не тільки знижує рівень захворюваності культур, а й збагачує продукцію цукром, крохмалем та вітамінами.

Препарат також сприяє ефективності запилення, збільшує кількість генеративних органів і протидіє обсіпання квітів та плодів, тож є корисним для польових, овочевих, садових культур тощо.

Переваги добрива:

- регулює білковий та вуглеводний обмін, підвищує ефективність фотосинтезу, завдяки вмісту бору;
- забезпечує інтенсивний ріст рослини, через вміст азоту;
- скорочує терміни дозрівання с/г культур;
- формує міцну кореневу систему;
- сприяє хорошему процесу запилення та запліднення квіток;
- покращує стійкість рослин до стресових умов;
- збільшує стійкість росту зелених насаджень, через високий вміст калію;
- збільшує врожайність.

Застосування для позакореневого підживлення:

Культура	Норми використання	Обробка в період вегетації
Кукурудза	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е у фазу 4-6 листків; 2-е у фазу 6-8 листків.
Соняшник, ріпак озимий	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	3-х кратне обприскування: 1-е у фазу 2 листків / розетка (осінь); 2-е у фазу 7-10 листків / стеблювання; 3-е у фазу бутонізації.
Соя	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування: 1-е у фазу 3-4 листків; 2-е у фазу бутонізації.
Гречка	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування: 1-е у фазу бутонізації; 2-е у фазу цвітіння.
Огірок, томат, перець, баклажан, салат, капуста	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	1-е обприскування в фазу появи 5-7 бутонізації.
Картопля, морква, буряк цукровий	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування: 1-е у фазу появи 5-7 листків; 2-е у фазу бутонізації / змикання листя в ряді.
Плодові дерева	1,5 - 3 л розвести на 1000 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування: 1-е перед цвітінням; 2-е у фазу цвітіння.
Виноград	1,5 - 3 л розвести на 1000 л води та розчином обробити 1 га	1-е обприскування в фазу бутонізації.

Рекомендація

Для кращого ефекту можна використовувати в комплексі з карбамідом.

Пшениця, соняшник, кукурудза, ріпак тощо

6-10 кг карбаміду на 1 гектар

Бобові

4-6 кг карбаміду на 1 гектар



ГАЛИЧИНА

ОРґАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Гумат Калію +ЦИНК



Фасування:

5 л

20 л

1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,7 – 1,5 л/га.

Хімічний склад:

Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)	Цинк (Zn)
12,7 г/л.	6,7 г/л.	24,8 г/л.	42 г/л.

- містить макро- та мікроелементи
Co, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo
- гумусові речовини – 82,5 г/л.

- гумінові кислоти – 44,1 г/л.
- фульвокислоти – 38,4 г/л.
- pH – 8-9



Гумат калію + ЦИНК – концентроване органо-мінеральне гумінове добриво, яке містить у своєму складі збільшений вміст цинку, азоту, фосфору та калію. Наявність цинку у складі препарату зменшує накопичення азотних сполук у рослині, при цьому підвищує вміст білкових речовин та вуглеводів, покращує

синтез цукру та крохмалю. Цей препарат позитивно впливає на розвиток рослин та дозрівання плодів і, навіть, покращує їх смакові якості та класність врожаю. Рослини, оброблені даним препаратом, мають більшу стійкість до спеки та холоду, посухи чи підвищеної вологості. Засіб екологічний та простий у застосуванні.

Переваги добрива:

- ✓ сприяє росту коренів і пагонів, збільшує цукристість плодів, в наслідок вмісту цинку;
- ✓ забезпечує інтенсивний ріст рослини, через вміст азоту;
- ✓ скорочує терміни дозрівання с/г культур;
- ✓ збільшує стійкість росту зелених насаджень, через високий вміст калію;
- ✓ сприяє хорошему процесу запилення та запліднення квіток;
- ✓ покращує стійкість рослин до стресових умов;
- ✓ формує міцну кореневу систему;
- ✓ збільшує врожайність.

Застосування для позакореневого підживлення:

Культура	Норми використання	Обробка в період вегетації
Пшениця, жито, овес, ріпак, соя, горох	0,75 - 1 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е у фазу сходів - 4-6 листків; 2-е у фазу цвітіння - бутонізації.
Соняшник, кукурудза на зерно, силос	0,75 - 1,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е у фазу сходів - 4-6 листків; 2-е у фазу утворення корзинки / волоті.
Огірок, томат, перець, баклажан, салат	0,7 - 1 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	3-х кратне обприскування рослин у період вегетації: 1-е у фазу появи 2-4-х листків; 2-е і 3-є з інтервалом 14 днів.
Картопля, морква, буряк цукровий	0,7 - 1 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування: 1-е у фазу появи 5-7 листків; 2-е у фазу бутонізації.
Зерняткові та кісточкові плодови, виноград	1,5 - 2,5 л розвести на 300 л води та розчином обробити 1 га	2-х кратне обприскування дерев: 1-е перед цвітінням; 2-е в період закладки квіткових бруньок.

Рекомендація

Для кращого ефекту можна використовувати в комплексі з карбамідом.

Пшениця, соняшник, кукурудза, ріпак тощо

6-10 кг карбаміду на 1 гектар

Бобові

4-6 кг карбаміду на 1 гектар



ГАЛИЧИНА

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Деструктор Стерні



Фасування:

- 5 л
- 20 л
- 1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
2 – 4 л/га.

Хімічний склад:

Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)
12 г/л.	0,7 г/л.	13,8 г/л.

- містить макро- та мікроелементи
B, Co, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo
- гумусові речовини – 104 г/л.

- гумінові кислоти – 70 г/л.
- фульвокислоти – 34 г/л.
- pH – 10-11



Деструктор стерні – гуміновий препарат, розроблений для ефективного розкладання рослинних залишків, таких як стерня, солом, кореневища і листя, які залишаються в ґрунті після збирання врожаю. Збагачений високою концентрацією гумінових речовин, деструктор соломи активно стимулює мікроорганізми в

ґрунті, сприяючи прискоренню процесу розкладання органічного матеріалу. Його швидка та ефективна дія сприяє не лише ефективному видаленню рослинних залишків, але й утворенню в ґрунті важливого для рослин гумусу, що позитивно впливає на його структуру та родючість.

Переваги добрива:

- активізує розкладання рослинних залишків;
 - збільшує біологічної активності ґрунту;
 - збагачує та поліпшує стан ґрунту;
- обмежує розвиток патогенних мікроорганізмів;
 - сприяє утворенню гумусу з решток рослин;
 - покращує мікрофлору ґрунту.

Рекомендації щодо застосування

Культура	Норми використання	Сечовина	Робочий розчин
Кукурудза, соняшник (суха маса)	2 – 4 л/га.	25 – 30 кг/га.	200 – 300 л/га.
Зернові (пшениця, жито, ячмінь, овес, просо) суха маса	2 – 3 л/га.	10 – 15 кг/га.	200 – 300 л/га.
Соняшник, кукурудза на зерно, силос	1,5 – 2,2 л/га.	5 – 7 кг/га.	200 – 300 л/га.
Сидерати: гірчиця, редька олійна, бобові, зерново-бобова суміш	1,5 – 2,2 л/га.	7 – 10 кг/га.	200 – 300 л/га.



Розчин вноситься по стерні за допомогою оприскувача та зароблюється в ґрунт (передисковується)



Мікродобрива



Мікродобриво БОР



Фасування:

5 л 20 л 1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,7 – 1,5 л/га.

Хімічний склад:

Бор (В)	Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)
150 г/л.	не менше 60 г/л.	не менше 10 г/л.	не менше 10 г/л.

• pH – 7



Бор – висококонцентроване мікродобриво, що містить бор у формі органічного комплексу. Сучасний препарат для позакореневого, кореневого підживлення, передпосівної обробки посівного матеріалу бором у рідкій формі. Продукт виготовлений на основі поліборатів, додатково збагачений NPK (азот, фосфор, калій) в біодоступній для рослин формі.

Відповідає вітчизняним стандартам якості та безпеки.

Рекомендується для корекції підживлення всіх сільськогосподарських культур і особливо чутливих до дефіциту бору – соняшник, соя, ріпак, капуста, картопля, цукровий та кормовий буряк, зерняткові дерева та інші.

Переваги добрива:

- ✓ покращує цвітіння та запилення;
- ✓ посилює процеси плодоутворення;
- ✓ підвищує цукристість;
- ✓ запобігає хворобам, спричинених нестачею бору;
- ✓ збільшує терміни зберігання врожаю;
- ✓ легко розчиняється у воді, не утворює осадів, пластівців;
- ✓ швидко засвоюється рослинами у хелатній формі;
- ✓ підвищує врожайність зернових на 20%, а овочів та ягід – на 20-40%.

Рекомендація щодо застосування:

Культура	НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ		К-СТЬ ОБРОБОК	ІНТЕРВАЛ МІЖ ПІДЖИВЛЕННЯМИ	ПЕРШЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
	ДОБРИВО «ГАЛИЧИНА»	РОБОЧИЙ Р-Н			
Зернові колосові, зернові, олійні, бобові, овочеві культури, картопля та ін.	1 - 2 л/га.	200 - 300 л/га.	2 - 3	10 - 14 днів	У фазу 3 - 6 листків
Плодові дерева, виноград	1 - 2 л/га.	500 - 1000 л/га.	2 - 3	10 - 14 днів	Перед цвітінням



Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.



Хелат ЦИНК



Фасування:

5 л

20 л

1000 л



Препаративна форма:
розчинний концентрат



Норма витрат:
0,7 – 1,5 л/га.

Хімічний склад:

Цинк (Zn)	Азот (N)	Фосфор (P ₂ O ₅)	Калій (K ₂ O)
100 г/л.	не менше 10 г/л.	не менше 10 г/л.	не менше 10 г/л.

• pH – 5-8



Хелат цинку — це металоорганічна сполука, що утримує іони цинку. Додатково комплекс збагачений NPK (азот, фосфор, калій) в біодоступній для рослин формі. Мікродобриво цинк рекомендований для використання господарствами в усіх регіонах країни. Адже понад 60% сільськогосподарських земель мають виражений дефіцит рухомих форм цинку (0,2–0,3 мг/кг ґрунту).

Особлива чутливість до дефіциту мікроелемента спостерігається у зернових, технічних, олійних культурах, овочах та ягодах. Цей препарат допоможе розкрити генетичний потенціал урожайності високопродуктивних гібридів та сортів. Рекомендується для корекції підживлення всіх сільськогосподарських культур і особливо чутливих до дефіциту цинку – кукурудза, ріпак, бобові, овочеві, зерняткові, виноград.

Переваги добрива:

- ✓ підвищує ефективність запилення та життєздатність насіння;
- ✓ надає активний ріст на стадіях вегетації;
- ✓ сприяє підвищенню посухо-, жаро- і холодостійкості;
- ✓ стимулює коренеутворення, біосинтез хлорофілу;
- ✓ покращує стійкість рослин щодо ураження мікозами;
- ✓ покращення якості та класності врожаю.

Рекомендація щодо застосування:

Культура	НОРМА ВИТРАТ		К-СТЬ ОБРОБОК	ІНТЕРВАЛ МІЖ ПІДЖИВЛЕННЯМИ	ПЕРШЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
	ДОБРИВО «ГАЛИЧИНА»	РОБОЧИЙ Р-Н			
Зернові колосові, зернові, олійні, бобові, овочеві культури, картопля та ін.	1 - 2 л/га.	200 - 300 л/га.	2 - 3	10 - 14 днів	У фазу 3 - 6 листків
Плодові дерева, виноград	1 - 2 л/га.	500 - 1000 л/га.	2 - 3	10 - 14 днів	У фазу бутонізації



Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.



Прилипач- ад'ювант



Прилипач-ад'ювант



Фасування:

1 л

5 л



Препаративна форма:
рідина



Норма витрат:
1 л на 1 т робочого розчину



Розхід:
200-300 мл/га.



Діюча речовина:
оксиетилен алкілфенолу



Прилипач-ад'ювант — комплекс полімерів з клейкими властивостями, для ефективного утримання робочого розчину на поверхні рослин. Його механізм дії базується на тонкому та рівномірному нанесенні на листя та стебла, створюючи захисну плівку.

Ця плівка функціонує як бар'єр, запобігаючи стіканню розчину та забезпечуючи стійкість діючої речовини на поверхні рослини. Важли-

вим аспектом є те, що прилипач гарантує продовжений контакт активного компонента з рослинною поверхнею, що є ключовим для оптимального абсорбції та ефективності застосування засобів захисту та добрив.

Використання прилипача в сільському господарстві забезпечує не лише високу стійкість до зношування плівки, але й максимальну ефективність у використанні засобів для досягнення найкращого можливого результату врожаю.

Переваги препарату:

- ✓ покращення розтікання та прилипання робочого розчину по листовій поверхні;
- ✓ забезпечує максимальний контакт діючої речовини з рослинною поверхнею, підвищуючи адгезію та забезпечуючи оптимальне засвоєння;
- ✓ підвищення ефективності добрив, захисту рослин від шкідників, а також посилення дії гербіцидів та пестицидів;
- ✓ покращення стійкості до змивання чи випаровування;
- ✓ підвищення стійкості до впливу дощу, сильної роси та ультрафіолетових променів;
- ✓ зменшує витрати робочого розчину від впливу вітру.

Рекомендація щодо застосування:

Культура	Передпосівна обробка насіння Замочування коренів садженців	Обробка в період вегетації
Польові, овочеві та ягідні культури	0,1 л на 10 л води на 1 т	0,2 - 0,3 л препарату на 200-300 л/га води
Плодові дерева, виноград	0,1 л на 50 л води	1 л препарату на 1000 л/га води



gumat.biz

Відправляю добрива з заводу м.Дрогобич Новою Поштою,
оплата після отримання.

Телефонуйте мені особисто: 097-877-64-88 або 066-2003004
менеджер-консультант Лобанов Ігор Олександрович
мій Сайт gumat.biz